

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С РЕБЕНКОМ?

1. Помните, что это ваш ребенок и вы его любите. Помочь подростку может только адекватный родитель, не теряющий самообладания.
2. Расскажите о вреде этих веществ, о их влиянии на организм и на жизнь человека в целом понятным для подростка языком с учетом его возраста.
3. Спокойно разберитесь в ситуации. Крики, угрозы и запугивание только ухудшат ситуацию. Подросток замкнется в себе и будет видеть в родителях врагов, в силу подросткового максимализма.
4. Обеспечьте ребенка полезным досугом, поощряйте его за полезные увлечения, любые успехи и достижения.
5. Тактично контролируйте круг общения сына или дочери, чаще приглашайте их друзей домой.
6. При необходимости обратитесь за помощью к специалистам.

Помните, что только вы можете обезопасить своих детей от пагубных привычек, показывая здоровый образ жизни на своем примере!!!

Знать, чтобы уберечь (осторожно, сниффинг)

(буклет для родителей, 18+)



Сниффинг - форма токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхание паров химических соединений используемого в бытовых приборах газа, летучих веществ, входящих в состав освежителей воздуха, дезодорантов, а также выделяемых из горячих жидкостей, таких, как растворители, бензин и клей, которые имеют свободное обращение в гражданском обороте.

Сниффинг происходит от английского «sniff» – «нюхать, вдыхать».

РОДИТЕЛЬ, НАСТРОЖИСЬ, ЕСЛИ:



✓ почувствовал характерный запах вещества от одежды и волос ребенка (запах клея, бензина, ацетона и т.д.);

- ✓ верхняя часть тела ребенка, его голова обычно горячие на ощупь (прилив крови), лицо отёчное;
- ✓ ребенок ходит, пошатываясь, если раньше ходил уверенно;
- ✓ у ребенка сужены или чрезмерно расширены зрачки, ширина зрачков не соответствует освещению (известно, что при ярком свете зрачки сужаются, в темноте — расширяются);
- ✓ ребенок невнятно говорит, если раньше речь была отчётливая;
- ✓ вокруг губ, особенно в уголках рта, у ребенка заметили кайму раздражения кожи;
- ✓ отмечаете у ребенка перепады настроения: то буйная весёлость, то усталость, вялость, подавленность, апатия;
- ✓ у ребенка наблюдаете слабость, тошноту и рвоту;
- ✓ у ребенка периодически «зверский» аппетит или желание есть отсутствует вовсе.

МИФЫ И ФАКТЫ О СНИФФИНГЕ

МИФ: Существует определенная летальная доза.



ФАКТ: Даже однократное вдыхание токсичного газа может привести к смерти от удушья, паралича дыхательного центра в мозге, токсического отека головного мозга, закупорки дыхательных путей рвотными массами, отека легких в ответ на проникновение паров газов для зажималок в бронхи и альвеолы.

МИФ: Родители сразу обнаружат, если ребенок вдыхает пары различных химических соединений газа.

ФАКТ: В большинстве случаев родители обнаруживают, что их сын или дочь вдыхают пары газа, не сразу.

Подросткам удастся долгое время скрывать от родителей факты употребления, так как запаха от смеси газов может и не оставаться. Поэтому понять, потребляет ваш ребенок газ или нет, очень сложно.



МИФ: Неблагополучная атмосфера в семье, попустительский стиль воспитания не являются причинами того, что ребенок начал вдыхать пары газа. Влияет лишь компания, в которой находится ребенок.



ФАКТ:

Доброжелательная атмосфера дома, доверительные отношения с родными — залог благополучия.

Если ребенку тяжело дома, начинаются проблемы в школе, с друзьями. Затем он примыкает к компании таких же ребят, где начинают употреблять алкоголь, вдыхать пары газа и т.д..

МИФ: Дети до 15 лет не замечены в потреблении паров газа.

ФАКТ:

К сожалению, средний возраст юных токсикоманов по России - 8 - 15 лет.



© Can Stock Photo